

《実施医療機関》(必ず予約してから行ってください。)

の医療機関が、デジタル予診票対応医療機関です。

○印は実施 ×印は未実施

医療機関名	住所	電話番号	四種混合	二種混合	日本脳炎	ポリオ	MR 麻しん 風しん	BCG	ヒブ	小児肺炎球菌	B型肝炎	ロタウイルス	水ぼうそう	医療機関名	住所	電話番号	四種混合	二種混合	日本脳炎	ポリオ	MR 麻しん 風しん	BCG	ヒブ	小児肺炎球菌	B型肝炎	ロタウイルス	水ぼうそう
石井医院(小児科)	沼	24-5333	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	にじのこどもクリニック	河辺	32-8201	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
いちば医院	二宮	28-8300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	はなこどもクリニック	東一宮	27-7277	○	○	○	○	MRのみ	○	○	○	○	○	○
おおうみクリニック	河辺	21-0033	○	○	○	×	○	×	○	○	○	×	○	林小児科	山下	22-1256	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
小畑醫院	大田	27-2111	○	○	○	×	○	×	○	○	×	×	○	平福診療所	平福	28-3858	×	2期のみ	×	×	×	×	×	×	×	×	×
かたやま小児科クリニック	山北	24-1310	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ふくはら小児科内科(旧ぬかだ健康クリニック)	山北	23-6331	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
河原内科 松尾小児科クリニック	二宮	28-5570	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	安田医院	上河原	23-5537	○	2期のみ	○	×	MRのみ	×	○	○	○	×	○
かんだ小児科医院	勝間田町	24-1222	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	弓狩クリニック	南新座	24-2035	○	2期のみ	○	○	MRのみ	○	○	○	○	○	○
坂本クリニック	高野本郷	21-1066	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	只友医院	加茂町塔中	42-2043	×	2期のみ	児童のみ	×	×	×	×	×	×	×	×
多胡クリニック	草加部	29-7111	×	2期のみ	2期のみ	×	○	×	×	○	×	×	×	ひらいクリニック	加茂町中原	42-3131	×	×	○	×	MRのみ	×	×	×	×	×	○
辻医院	小原	23-2567	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	万袋医院	加茂町中原	42-3025	×	2期のみ	2期のみ	×	○	×	×	×	×	×	×
津山中央病院小児科	川崎	21-8111	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	影山医院	上村	29-1511	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
津山中央クリニック	二階町	22-6113	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	勝北診療所	杉宮	29-2324	○	2期のみ	○	×	MRのみ	○	○	○	○	○	○
津山ファミリークリニック	高野本郷	26-2221	○	○	○	○	MRのみ	○	○	○	○	○	○	勝北すこやかクリニック	坂上	29-7701	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
中尾内科クリニック	沼	24-4488	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	日本原病院	日本原	36-3311	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×
中西クリニック	東一宮	27-7200	×	2期のみ	2期のみ	×	×	×	×	×	×	×	×	本位田診療所	新野東	36-5613	○	○	×	○	○	×	×	×	×	×	○
西医院	高野本郷	26-5522	×	2期のみ	○	×	○	×	×	×	×	×	○	くめ診療所	宮尾	57-7300	×	2期のみ	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※お知らせの通知については初回接種のみとなります。追加接種の通知はありませんので、忘れずに追加接種を受けてください。

予防接種を受ける前に注意すること
 ★お子さんの体調は良いですか。
 ★今日の予防接種について、必要性、効果、副反応などを理解していますか。
 ★予診票の記入は済みですか。
 ★親子(母子)健康手帳は持ちましたか。
 ★お子さんのことがよくわかっている保護者が同伴してください。

予防接種を受けた後に注意すること
 ★接種後30分間は、お子さんの様子を特に観察しましょう。
 ★接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすことはやめましょう。
 ★接種当日は、激しい運動はさけましょう。
 ★接種後にひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

- ◆医師が必要と認めた場合には、他の予防接種と同時に接種することができます。
- ◆麻しんにかかった場合は治癒後4週間程度、風しん・水痘・おたふくかぜにかかった場合は治癒後2～4週間程度、その他のウイルス性疾患(突発性発疹・手足口病など)にかかった場合は治癒後2週間以上の間隔をあけて接種してください。
- ◆麻しん風しん混合・麻しん・風しん・BCG・水ぼうそうは注射生ワクチンです。接種後27日間は他の注射生ワクチンの予防接種を受けないでください。(※ロタウイルスワクチンは経口生ワクチンです)
- ◆接種後、生ワクチンでは2～3週間、不活化ワクチンでは24時間は副反応の出現に特に注意しましょう。
- ◆予防接種は体調の良い時に受けましょう。万一、接種後にひどい腫れ・高熱・ひきつけなどの症状があった場合は、医師の診断をうけてください。お子さんの症状が予防接種副反応疑い報告基準に該当する場合は医師から独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ副反応疑いの報告が行われます。
- ◆ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。定期の予防接種によって医療機関で治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じ、この副反応と予防接種法に基づく定期の予防接種との因果関係を厚生労働大臣が認定した場合は、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
- ◆新型コロナワクチン接種の前後に他の予防接種を行う場合は、原則として13日以上の間隔を空けることになっています。

～ お子様以下の状態の場合は予防接種を受けることができません ～

- ・明らかな発熱(通常37.5℃以上を発熱といいます)がある場合
- ・重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
- ・受けるべき予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシー(ショック・じんましん・呼吸困難等)を起こしたことがある場合
- ・その他、予防接種を行うことが不適当な状態の場合



お問い合わせ先 津山市健康増進課(津山すこやか・こどもセンター1階) 電話:0868-32-2069

