

トマトキバガ登録農薬一覧(令和5年11月28日現在)

| 農薬の種類 | 使用方法 | 使用時期 | 散布液量 | 希釈倍数使用量 | 本剤の使用回数 | 登録作物 | |
|-------------------|------|--------------|---------------------------|------------|---------|------|-------|
| | | | | | | トマト | ミニトマト |
| シアントラニプロール水和剤 | 散布 | 収穫前日まで | 100～300L/10a | 2000倍 | 3回以内 | ○ | ○ |
| | 灌注 | 育苗期後半～定植当日 | 400株当り10～20L(1株当り25～50mL) | 400株当り25mL | 1回 | ○ | ○ |
| シアントラニプロール粒剤 | 株元散布 | 育苗期後半～定植時 | - | 2g/株 | 1回 | ○ | ○ |
| アバメクテン乳剤 | 散布 | 収穫前日まで | 100～300L/10a | 500～1000倍 | 3回以内 | ○ | × |
| インドキサカルブ水和剤 | 散布 | 収穫前日まで | 100～300L/10a | 2000倍 | 2回以内 | ○ | × |
| エマメクテン安息香酸塩乳剤 | 散布 | 収穫前日まで | 100～300L/10a | 2000倍 | 5回以内 | ○ | ○ |
| クロルフェナピル水和剤 | 散布 | 収穫前日まで | 100～300L/10a | 2000倍 | 3回以内 | ○ | ○ |
| 脂肪酸グリセリド・スピノサド水和剤 | 散布 | 収穫前日まで | 100～300L/10a | 1000倍 | 2回以内 | ○ | ○ |
| スピネトラム水和剤 | 散布 | 収穫前日まで | 100～300L/10a | 2500～5000倍 | 2回以内 | ○ | ○ |
| テトラニプロール水和剤 | 散布 | 収穫前日まで | 100～300L/10a | 2500倍 | 3回以内 | ○ | ○ |
| ピリダリル水和剤 | 散布 | 収穫前日まで | 100～300L/10a | 1000倍 | 2回以内 | ○ | ○ |
| フルキサメタミド乳剤 | 散布 | 収穫前日まで | 100～300L/10a | 2000倍 | 2回以内 | ○ | ○ |
| フルベンジアミド水和剤 | 散布 | 収穫前日まで | 100～300L/10a | 2000倍 | 2回以内 | ○ | ○ |
| メタフルミゾン水和剤 | 散布 | 収穫前日まで | 100～300L/10a | 1000倍 | 3回以内 | ○ | ○ |
| BT水和剤 | 散布 | 発生初期但し収穫前日まで | 100～300L/10a | 1000倍 | - | ○ | ○ |